
Clé ARCHI pour le Douglas (Pseudotsuga menziesii)





Houppier HC ou houppier Hors Concurrence : partie du houppier excluant les zones inférieures ou latérales soumises à des phénomènes de concurrence.

Flèche: partie sommitale du tronc comprenant les six derniers étages de branches.

Feuillage des branches : seul le feuillage des branches d'origine séquentielle est concerné, pas celui des suppléants.

Suppléants vigoureux : suppléants plagiotropes ou orthotropes présentant une forte dominance apicale, une forte croissance et une sexualité absente ou rare.

Suppléants nombreux : suppléants présents sur plus de 50% des branches et les recouvrant sur plus du quart de leur longueur.

2º houppier : structure constituée de branches et de suppléants vigoureux, ces derniers étant hiérarchisés entre eux (soit dominants, soit dominés).

Clé ARCHI pour le Douglas (Pseudotsuga menziesii)

Les 3 types de suppléants



Plagiotropes





Agéotropes

Densité du feuillage porté par les branches et leurs draperie de rameaux



Tronc caché



Quasi-totalité du tronc caché



Tronc visible

- Avec des jumelles, faire le tour de l'arbre
- Distance d'observation = hauteur de l'arbre
- Respecter les zones d'observation
- Attendre après intervention sylvicole



Orthotropes